

Offre spéciale valable du 01.05. au 27.07.2025

Les conditions suivantes sont également disponibles pour vous via une **commande XML** auprès d'axapharm.



XML



office@axapharm.ch



041 766 83 84



041 766 83 83



NOUVEAU: Sildénafil axapharm 50 mg, 24 comprimés pelliculés sécables

- Conditionnement économique
- Petit comprimés pelliculés sécables – pour une prise orale simple

Article	Pharma-code	PEF	15% à partir de 1 pce.	25% à partir de 5 pcs.	30% à partir de 10 pcs.	Quantité
Sildénafil axapharm 50 mg, 24 comprimés pelliculés sécables	1134686	89.14	75.77	66.86	62.40	-----
Légende: PEF: Prix ex-factory						

Conditions supplémentaires pour ces produits (selon l'accord écrit de OITPTh):

- + 1% d'indemnisation sur tous les produits d'une valeur de la commande de plus de CHF 500.- / 2% d'indemnisation sur tous les produits d'une valeur de la commande de plus de CHF 1 000.-
- + 3% d'indemnisation pour les commandes par XML
- + 2% d'escompte sur les factures mensuelles par système de recouvrement direct (LSV ou DD) dans un délai de 10 jours

Les frais de transport s'élèvent à CHF 17.- pour toute commande inférieure à CHF 150.- (netto).

Des modifications sont possibles en tout temps.

Sildénafil axapharm, 25 mg, 50 mg (sécable), 100 mg (quadriséable), comprimés. **I:** Dysfonction érectile. **P:** Prise en cas de besoin env. 1 h avant un rapport sexuel. Dose recommandée: 50 mg 1x/j. Dose maximale: 100 mg 1x/j. Prise 1x/j. au max. Instructions spéciales pour le dosage: Patients âgés, insuffisance hépatique, insuffisance rénale sévère, co-administration d'un inhibiteur du CYP3A4 ou d'un alpha-bloquant: Dose initiale de 25 mg/j. Co-administration de ritonavir: max. 25 mg/48 h. **CI:** Hypersensibilité aux composants, traitement par des dérivés nitrés, des donneurs de monoxyde d'azote, utilisation des «poppers» (nitrite d'amyle), stimulateurs de la guanylate cyclase, insuffisance cardiaque sévère, angor instable, NAION, maladies dégénératives héréditaires de la rétine, <18 ans, femmes. **P:** Affection cardiovasculaire aiguë: ne pas traiter en plus avec des dérivés nitrés, prendre en compte le statut cardiovasculaire. Hypotension, hypertension non contrôlée, AVC ou infarctus du myocarde récemment souffert, arythmies, immédiatement interrompre le traitement en cas de perte subite de la vue, priapisme, troubles de la coagulation, ulcère peptique actif, association avec d'autres procédés de traitement d'une dysfonction érectile. **IA:** Dérivés nitrés, donneurs de monoxyde d'azote, stimulateurs de la guanylate cyclase, alpha-bloquant, inhibiteurs ou inducteurs du CYP3A4, ritonavir, anticoagulants. **EI:** Céphalées, vertiges, vision trouble, altération de la vision des couleurs et autres troubles visuels, bouffées congestives/bouffées de chaleur, congestion nasale, dyspepsie, nausées. **Liste B. Tit. de l'AMM: axapharm ag, 6340 Baar.** État août 2023. Plus d'informations sous www.swissmedinfo.ch

Merci pour votre commande!

Date, signature

Timbre

axapharm

Votre partenaire santé suisse

axapharm ag, 6340 Baar

05_2025_V1